

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tantum, 30 mg/g, crème
benzydaminehydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Tantum en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS TANTUM EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Tantum bevat benzydaminehydrochloride dat behoort tot de geneesmiddelengroep met de naam NSAIDs (Niet-steroidale anti-inflammatoire geneesmiddelen).

Tantum is een pijnstillend en zwellingsverminderend middel met een ontstekingsremmende werking. Tantum crème wordt toegepast op plaatsen waar zwelling en pijn optreden als gevolg van overbelasting en blessures (bij verstuikingen, verrekkingen en kneuzingen).

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Op een geïrriteerde huid en op open wonden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- als u een geïrriteerde huid heeft of overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor ontstekingsremmende middelen uit dezelfde groep als Tantum (NSAIDs) of acetylsalicylzuur.
- contact met de ogen en slijmvliezen moet vermeden worden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tantum nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen van Tantum met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Tantum kan kortdurend op kleine huidoppervlakken worden toegepast in het eerste en tweede trimester van de zwangerschap. Langdurig gebruik, toepassing op grote huidoppervlakken of gebruik in het derde trimester van de zwangerschap dient uitsluitend na overleg met uw arts plaats te vinden. Tantum kan tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt, mits het gebruik kortdurend is en het middel op kleine huidoppervlakken wordt toegepast. In geval van langdurig gebruik, of bij toepassing op grote huidoppervlakken, wordt het geven van borstvoeding ontraden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het lokale gebruik van benzydaminehydrochloride, in de aanbevolen dosis, heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Tantum bevat sorbinezuur en cetylalcohol

Kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Tantum bevat propyleenglycol

Dit middel bevat 50 mg propyleenglycol per gram crème.

Gebruik dit middel niet bij pasgeborenen jonger dan 4 weken met open wonden of grote beschadigde huidoppervlakken (zoals brandwonden) zonder eerst met uw arts of apotheker te overleggen.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is

Tantum crème is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik. Op de plaats van de aandoening de crème zachtjes in de huid wrijven totdat het volledig door de huid is opgenomen. Bij voorkeur dient de crème zo spoedig mogelijk na de overbelasting of het oplopen van de blessure op de huid te worden aangebracht. De crème één tot vier maal per dag zachtjes inmasseren, afhankelijk van de klacht.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Met het oog op de aard van dit product, is overdosering van Tantum onwaarschijnlijk.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Overgevoeligheid voor het product kan als bijwerking optreden. Hierbij kan huiduitslag, roodheid of overgevoeligheid voor licht of zonlicht ontstaan.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de tube is Tantum 1 maand houdbaar.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

De verpakking zorgvuldig gesloten houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is benzydaminehydrochloride. Eén gram crème bevat 30 mg benzydaminehydrochloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn glycerylmonostearaat (E471), cetomacrogol, decyloleaat (E570), cetylalcohol, propyleenglycol (E1520), fenoxxyethanol, sorbinezuur (E200), kaliumsorbaat (E202) en gezuiverd water.

Hoe ziet Tantum eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tantum is een gladde witte tot gebroken witte crème, verpakt in een doosje met tubes van 30, 60 gram en 120 gram (2 x 60 gram).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK ROGAT

Fabrikant

Medgenix Benelux NV
Vliegveld, 21
8560 Wevelgem
België

Dit geneesmiddel staat in het register ingeschreven onder RVG 06636.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2021